

01/10/2026

NOTIFICACION DE ACTUACIONES

Colocación de trampas de *Lymantria dispar* (Lagarta peluda)



Lymantria dispar é un lepidóptero da familia Erebidae (antes Lymantriidae) que pode producir graves defoliacións en masas de diferentes especies. A bolboreta femia é algo máis grande ca o macho, de 45 a 65 mm de envergadura. A femia ten as ás brancas, con algunhas manchas negras, o seu abdome é moi avultado

e pesado, o que a fai incapaz de voar e torpe para camiñar. O macho ten as ás de cor amarelo terrosa con manchas escuras en zigzag de cor marrón negruzco. O abdome é moito máis delgado que o da femia, case cónico, e é bo voador.

A eiruga recién nada mide de 3 a 3,5 mm. Son moi peludas e xeralmente de cor negruzca. Durante o crecemento, as eirugas fan 4 ou 5 mudas. A crisálida, marrón escuro, está provista no seu extremo apical de pelos sedosos, que usan para fixarse.

No **verán de 2024** detectáronse varios focos de ataques de *Lymantria dispar* nos concellos de **Negueira de Muñiz** e **Cervantes** na provincia de Lugo. Os danos afectaron nese momento a case 140 ha de matogueiras, breixos e carqueixas. No momento de detección da praga, a lagarta peluda atopábase



na última fase de eiruga, próxima a pasar á fase de crisálida. Durante os seguintes meses colocáronse trampas cebadas con feromonas sexuais para capturar as limantrias xa no estado de bolboreta.




Na primavera de 2025 revisáronse as zonas dos ataques, para establecer o avance da praga e o seu estado. Atopábase en fase larvaria e alimentándose, entre outras, das formacións de *Quercus robur* presentes na zona. Os danos por defoliacións eran importantes e comezaban a superar os alcanzados no 2024. No mes de **xullo dese ano**, realizouse un tratamento fitosanitario biolóxico a base de *Bacillus thuringiensis var kurstaki*. A complicada

orografía das zonas a tratar fixo necesario que os tratamentos se realizasen empregando medios aéreos, neste caso drons. **No mes de agosto**, colocáronse trampas cebadas con feromonas sexuais para capturar as Limantrias xa no estado de bolboreta. Estas trampas revisáronse periodicamente para coñecer a evolución da praga.

Na **primavera de 2026** comprobouse que non había xa danos no concello de Negueira de Muñiz polo que este foco se deu por controlado. No concello de Cervantes detectáronse 4 focos. Estudando a intensidade dos danos decidiuse a coloción de trampas para a captura de machos.

Estas trampas foron retiradas a **mediados neste mes de setembro** o comprobar que xa non había capturas.



Os **MÉTODOS DE CONTROL** empregados pola Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal para o control desta praga son:

1) **Análise en laboratorio da parasitación das postas.** A limantria é un lepidóptero asociado ás masas de *Quercus* en España, por este motivo, hai un gran número de parásitos naturais e depredadores que normalmente



controlan a poboación. Polo que unha vez detectadas as postas, envíanse ao laboratorio para a unha análise de viabilidade e parasitación e poder estimar a evolución da praga na seguinte primavera.

2) **Tratamentos fitosanitarios.** Na primavera, e tendo en conta a porcentaxe de eirugas eclosionadas, realízanse os tratamentos fitosanitarios formulados a base de *Bacillus thuringiensis*. É altamente selectivo, sen ningún efecto sobre outras especies distintas a estes lepidópteros específicos, estando certificado para o seu uso en Agricultura Ecolóxica. Logo destes tratamentos vólvense colocar trampas con feromonas para valorar a continuidade dos tratamentos fitosanitarios.

3) **Colocación de trampas con feromonas para a captura de machos.** Colócase unha trampa por hectárea, cebada con feromonas sexuais co fin de capturar machos e reducir os apareamentos e as postas de ovos viables.

4) **Revisións das trampas colocadas.** Cada 10 días fanse revisións das trampas para obter o número de machos capturados e elaborar a curva de voo, para os tratamentos de primavera.

5) **Colocación de caixas niño.** Favorecen a nidificación e así facilitan a presenza de aves insectívoras, polo que contribúen á redución natural das poboacións de pragas.